Suma® Tab D4

Tabletki na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń.

- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- dodatkowa skuteczność wobec szczepów opornych
- pełne działanie wirusobójcze
- idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych
- łatwe przygotowanie roztworów roboczych

**Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkt biobójczy – pozwolenie
nr 0891/04 (Kat. I, gr. 2 i 4)**

MEDILAB®

medilab.pl

Suma® Tab D4

Tabletki na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń.



PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo- i prątkobójczy oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) potwierdzone badaniami
- dodatkowe działanie przeciwko: L.monocytogenes, S.enterica oraz C.difficile i B.subtilis
- stężenie: min. 1 000 ppm; czas działania: min. 5 min.
- stabilność nieużywanego roztworu roboczego – min. 1 dzień
- polecany również do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- zalecany do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin oraz innych zabrudzeń organicznych
- możliwość zanurzania przedmiotów w roztworach w celu dezynfekcji, np. kaczek i basenów

SKŁAD CHEMICZNY

100 g produktu zawiera:
dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (NaDCC) – 997 g/kg. Każda tabletka o masie 2,75 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje działanie:
bakterio-, drożdżako-, grzybo- i prątkobójcze – w 15 min., pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – w 5 min. oraz dodatkowe działanie przeciwko: B.subtilis i C.difficile – w 15 min.

OPAKOWANIA

Suma Tab D4: puszka – 300 szt. tabletek

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego. Stosować w wodnych roztworach roboczych.

1. Odpowiednią liczbę tabletek (zgodnie z poniższą tabelą) rozpuścić w zimnej wodzie wodociągowej. Aby uzyskać roztwór roboczy o zawartości 1 000 ppm aktywnego chloru należy rozpuścić 1 tabletkę w 1,5 l wody.
2. Odczekać aż tabletki dokładnie się rozpuszczą, roztwór delikatnie zamieszać.
3. Nanosić na powierzchnie za pomocą ścierki lub mopa.
4. Powierzchnie dokładnie zmyć roztworem. Dezynfekowane przedmioty zanurzyć w roztworze. Odczekać wymagany czas ekspozycji.
5. Powierzchnie pozostające w kontakcie z żywnością po przeprowadzonej procedurze dezynfekcyjnej należy zmyć dodatkowo wodą zdatną do picia.

	Powierzchnie czyste: niezanieczyszczone organicznie			Powierzchnie brudne: zanieczyszczone organicznie		
SPEKTRUM BIOBÓJCZE	**B (w tym: L.monocytogenes, S.enterica), Y, V (Polio, Adeno, Noro)**	**B (w tym: L.monocytogenes, S.enterica), F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro)**	**C.difficile**	**B (w tym: L.monocytogenes, S.enterica), Y, V (Polio, Adeno, Noro)**	**B (w tym: L.monocytogenes, S.enterica), F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro)**	**C.difficile**
STĘŻENIE	1 000 ppm (0,18%) (1 tab./1,5l wody)	2 000 ppm (0,36%) (2 tab./1,5l wody)	5 000 ppm (0,90%) (5 tab./1,5l wody)	2 000 ppm (0,36%) (2 tab./1,5l wody)	6 000 ppm (1,08%) (6 tab./1,5l wody)	10 000 ppm (1,80%) (10 tab./1,5l wody)
CZAS EKSPOZYCJI	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.
1 tabletka	**1,5 litra** wody	**750 ml** wody	**300 ml** wody	**750 ml** wody	**250 ml** wody	**150 ml** wody
2 tabletki	**3 litry** wody	**1,5 litra** wody	**600 ml** wody	**1,5 litra** wody	**500 ml** wody	**300 ml** wody
5 tabletek	**7,5 litra** wody	**3,75 litra** wody	**1,5 litra** wody	**3,75 litra** wody	**1,25 litra** wody	**750 ml** wody
6 tabletek	**9 litrów** wody	**4,5 litra** wody	**1,8 litra** wody	**4,5 litra** wody	**1,5 litra** wody	**900 ml** wody
10 tabletek	**15 litrów** wody	**7,5 litra** wody	**3 litry** wody	**7,5 litra** wody	**2,5 litra** wody	**1,5 litra** wody
12 tabletek	**18 litrów** wody	**9 litrów** wody	**3,6 litra** wody	**9 litrów** wody	**3 litry** wody	**1,8 litra** wody

* Skuteczność biobójcza w warunkach brudnych wobec B.subtilis: 12 000 ppm – 15 min.

Inaktywacja zanieczyszczeń organicznych: rozlaną krew, wydaliny, wydzieliny zalać roztworem o stężeniu 10 000 ppm aktywnego chloru, odczekać 15 min., usunąć zanieczyszczenia jednorazowym ręcznikiem, a następnie ponownie zdezynfekować powierzchnię. Wszystkie czynności należy wykonywać w rękawicach ochronnych. Rękawice i pozostałe materiały użyte do dezynfekcji i zbierania zanieczyszczeń należy traktować jako materiał zakaźny (szczegółowe informacje w instrukcji postępowania z powierzchnią skażoną Medilab).

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 85 747 93 00 • **F:** 85 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2107-01

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE:

Diversey Polska Sp. z o. o.,
02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134
T: 22 328 10 00

WYTWÓRCA:

Diversey Europe Operations B.V.
Maarssenbroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht
The Netherlands • diversey.com

MEDILAB®

medilab.pl