



PLAN HIGIENY ŻŁOBKI | PRZEDSZKOLA

REŃCE I SKÓRA

CO?	KIEDY?	JAK?	CZYM?
Mycie rąk personelu placówki	<ul style="list-style-type: none"> Przed rozpoczęciem pracy Po wyjściu z toalety Przy widocznym zabrudzeniu Przed podawaniem posiłków Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami Przed dezynfekcją higieniczną, jeśli ręce są zabrudzone Zawsze w razie potrzeby 	Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika porcję płynu myjącego, rozprowadzić zgodnie ze schematem wg Ayliffe'a, następnie dokładnie spłukać i osuszyć dłonie.	Sterisol Äkta Liquid Soap Farena Dozownik łokciowy Sterisol Dozownik uniwersalny łokciowy
Dezynfekcja rąk personelu placówki	<ul style="list-style-type: none"> Przed rozpoczęciem pracy Po zakończeniu pracy Przed podawaniem posiłków Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami Zawsze w razie potrzeby UWAGA! Ręce przed dezynfekcją muszą być czyste i suche.	Na suchą skórę rąk nanieść preparat dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać w skórę rąk zgodnie ze schematem wg Ayliffe'a, a następnie aż do wyschnięcia przez minimum 30 s.	Sterisol AHD 1000 Sterisol Phago'Gel Phago'Gel Dozownik łokciowy Sterisol

POWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE

CO?	KIEDY?	JAK?	CZYM?
POWIERZCHNIE MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE:			
Odporne na działanie alkoholu, np.: stoliki, krzesła i wszelkie inne przedmioty ulegające zanieczyszczeniu	<ul style="list-style-type: none"> Zawsze w razie potrzeby Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci W czasie nasilonego występowania biegunk i przeziębienia zaleca się zwiększenie częstotliwości dezynfekcji 	Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki. Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. UWAGA! Preparaty stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie. UWAGA! Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi! Powierzchnie pozostające w kontakcie z nieopakowaną żywnością należy po dezynfekcji dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.	MediQuick alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 30 s lub Aerodesin 2000 alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min lub Mediwipes Plus chusteczki gotowe do użycia - min. 1 min lub Fugaten-Spray alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min
Wrażliwe na działanie alkoholu, np.: przewijaki, tapicerki, materace do ćwiczeń, foteliki, łóżeczka, termometry i inne małe powierzchnie ulegające zanieczyszczeniu	<ul style="list-style-type: none"> Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni Zawsze w razie potrzeby Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci W czasie nasilonego występowania biegunk i przeziębienia zaleca się zwiększenie częstotliwości dezynfekcji 	Nanieść preparat bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię z odległości 30 cm lub na suchą, czystą ściereczkę. Dokładnie rozprowadzić za pomocą ściereczki po całej powierzchni. Nie wycierać do sucha, nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. Przetrzeć powierzchnię chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. Powierzchnie pozostające w kontakcie z nieopakowaną żywnością należy po dezynfekcji dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.	Oxivir Plus Spray spray gotowy do użycia - min. 5 min Lysoformin Plus-Schaum pianka gotowa do użycia - min. 5 min lub Mediwipes DM chusteczki gotowe do użycia - min. 5 min

ZABAWKI	<ul style="list-style-type: none"> Zawsze w razie potrzeby Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci W czasie nasilonego występowania biegunk i przeziębienia zaleca się zwiększenie częstotliwości dezynfekcji 	Zabawki spryskać i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zalecanym czasem ekspozycji, po czym dokładnie zmyć wodą zdatną do picia. Nie stosować do zabawek pluszowych i tekstylnych.	Fugaten-Spray alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min lub MediQuick alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 30 s lub Lysoformin Plus-Schaum pianka gotowa do użycia - min. 5 min	
POMIESZCZENIA	Sale gimnastyczne, pokoje zabaw, szatnie, a w nich: podłogi, blaty, drzwi, glazury, parapety i inne duże zmywalne powierzchnie Łazienki, a w nich: umywalki, wanny, brodziki prysznicowe, muszle klozetowe	Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni Zawsze w razie potrzeby Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni Zawsze w razie potrzeby Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci	Za pomocą mopów i ściereczek myć i dezynfekować, przecierając dokładnie całą powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe. Tabletki rozpuścić w wodzie. Powierzchnie zmyć roztworem myjąco-dezynfekującym. Odczekać wymagany czas ekspozycji. Chusteczki inkrustowane chlorem zwilżyć wodą, odcisnąć nadmiar wody. Powierzchnie zmyć roztworem myjąco-dezynfekującym. Odczekać wymagany czas ekspozycji.	TASKI Sprint Degerm koncentrat do mycia i dezynfekcji 0,5% - min. 5 min 5 ml koncentratu/1 l wody Chlor-Clean tabletki - 2 tabl./1l wody, 10 tabl./5l - min. 5 min lub Chlor-Clean Wipes inkrustowane chlorem suche chusteczki - min. 5 min
SANITARIATY	Szybka dezynfekcja suchych powierzchni klozetów, desek klozetowych, nocników, spłuczek i umywalk	Zawsze w razie potrzeby Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci W czasie nasilonego występowania biegunk i przeziębienia zaleca się zwiększenie częstotliwości dezynfekcji	Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki. Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. UWAGA! Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi!	Fugaten-Spray alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min lub MediQuick alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 30 s

